

Safe use of Methotrexate الإستخدام الآمن لدواء ميثوتريكسايت

يُحظر تناول هذا العقار إذا كنت حاملاً. يجب إجراء حمل اختباري للتأكد من أنك لستِ حاملاً قبل بدء تناول هذا العقار. تحدثي إلى طبيبك في هذا الأمر قبل بدء تناول هذا العقار.

تجنبي استخدام هذا العقار إذا كنتِ قادرة على الحمل، وإذا كنتِ لا تستخدمين وسيلة منع حمل فعالة لتجنب حدوث حمل. يجب عليكِ استخدام وسيلة لمنع الحمل خلال فترة تناول هذا العقار.

إذا كنتِ تُرضعين رضاعة طبيعية. أوقفي الرضاعة الطبيعية عند تناول هذا العقار. قد تحتاجين أيضاً إلى عدم الرضاعة الطبيعية أثناء تناول هذا العقار ولبعض الوقت بعد تناول آخر جرعة

ما هي بعض الأشياء التي يلزمني معرفتها أو فعلها أثناء تناولي لهذا العقار؟

اخبر طبيبك أو احصل على المساعدة الطبية على الفور إذا ظهرت لديك أي من العلامات أو الأعراض التالية والتي قد تكون مرتبطة بآثار جانبية عالية الخطورة:

- أعراض لرد فعل تحسسي، مثل الطفح الجلدي، أو الشرى، أو الحكة، أو احمرار البشرة أو تورمها أو انتشار البثور عليها أو تقشرها، ويصاحب ذلك حمى أو بدون حمى، أو صفير عند التنفس، أو ضيق في الصدر أو الحلق، أو صعوبة في التنفس أو البلع أو الكلام، أو حدوث بحّة غير عادية، أو تورم في الفم أو الوجه أو الشفتين أو اللسان أو الحلق.
- علامات وجود مشكلة في البنكرياس مثل ألم شديد جداً في المعدة أو ألم شديد جداً في الظهر أو اضطراب شديد جداً في المعدة أو قيء
- أعراض مشاكل الكلى مثل عدم القدرة على التبول أو تغير في كمية البول أو وجود دم في البول أو زيادة كبيرة في الوزن.
- أعراض تشير إلى وجود مشكلات في الكبد، مثل البول داكن اللون، أو البراز فاتح اللون، أو القيء، أو اصفرار الجلد أو العينين.
- أعراض الإصابة بمشكلات في الرئة أو التنفس مثل ضيق النّفس.
- أعراض لمشكلات بالأعصاب مثل الشعور حرق أو بخدر أو وخز غير عادي، أو الشعور بالوهن، أو عدم القدرة على تحريك جزء من الجسم (شلل).
- أعراض رد فعل جلدي حاد (متلازمة ستيفنس جونسون) مثل احمرار الجلد أو تورمه أو انتشار البثور عليه أو تقشره (مع ارتفاع في درجة الحرارة أو بدون ذلك)؛ أو احمرار العين أو تهيجها؛ أو قروح في الفم أو الحلق أو الأنف أو العينين.

Pharmacy Services Department –Reference: JHAH Health Encyclopedia and Product Information

This content is for informational purposes and is not intended to be a substitute for the advice of a healthcare professional. It is important that you rely on the advice of a healthcare professional for your specific condition

هذا المحتوى هو لأغراض تثقيفية وهو ليس معد كبديل للنصيحة التي يقدمها الطبيب أو مقدم الرعاية الصحية. من المهم أن تعتمد على نصيحة طبيبك ومقدم الرعاية الصحية فيما يخص حالتك.

Safe use of Methotrexate

الإستخدام الآمن لدواء ميثوتريكسايت

Do NOT take this medication if you are pregnant.

You must have pregnancy tests that show you are **NOT pregnant before starting this medication.**
Discuss with your doctor before starting this medication.

Do not take this drug if you are able to get pregnant and are not using effective birth control to prevent pregnancy. You must use birth control while taking this drug.

If you are breast-feeding. Do not breast-feed while you take this drug. You may also need to avoid breast-feeding for some time after your last dose.

What are some things I need to know or do while I take this medication?

Tell your doctor or get medical help right away if you have any of the following signs or symptoms that may be related very serious effects:

- Signs of an allergic reaction, like rash; hives; itching; red, swollen, blistered, or peeling skin with or without fever; wheezing; tightness in the chest or throat; trouble breathing, swallowing, or talking; unusual hoarseness; or swelling of the mouth, face, lips, tongue, or throat.
- Signs of a pancreas problem like very bad stomach pain, very bad back pain, or very bad upset stomach or throwing up.
- Signs of kidney problems like unable to pass urine, change in how much urine is passed, blood in the urine, or a big weight gain.
- Signs of liver problems like dark urine, light-colored stools, throwing up, or yellow skin or eyes.
- Signs of lung or breathing problems like shortness of breath.
- Signs of nerve problems like a burning, numbness, or tingling feeling that is not normal; weakness; or not being able to move a part of the body (paralysis).
- Signs of a severe skin reaction (Stevens-Johnson syndrome) like red, swollen, blistered, or peeling skin (with or without fever); red or irritated eyes; or sores in the mouth, throat, nose, or eyes.

Pharmacy Services Department –Reference: JHAH Health Encyclopedia and Product Information

This content is for informational purposes and is not intended to be a substitute for the advice of a healthcare professional. It is important that you rely on the advice of a healthcare professional for your specific condition

هذا المحتوى هو لأغراض تثقيفية وهو ليس معد كبديل للنصيحة التي يقدمها الطبيب أو مقدم الرعاية الصحية. من المهم أن تعتمد على نصيحة طبيبك ومقدم الرعاية الصحية فيما يخص حالتك.