

Safe use of Rivaroxaban الإستعمال الآمن لدواء ريفاروكسابان

- لا تتوقف عن تناول هذا العقار دون الرجوع إلى طبيبك. قد يؤدي إيقاف تناول هذا العقار مع حاجتك إلى الاستمرار في تناوله إلى زيادة احتمالات الجلطات الدموية. إذا اضطرت إلى التوقف عن استخدام هذا الدواء، فسيخبرك طبيبك بكيفية فعل ذلك.
- الأشخاص الذين خضعوا لأي نوع من الإجراءات النخاعية أو فوق الجافية تزداد لديهم احتمالات الإصابة بمشاكل نزيف حول العمود الفقري عند استمرار معالجتهم بهذا العقار. نادراً ما يحدث هذا النزيف، لكنه قد يؤدي إلى عدم القدرة على الحركة (شلل) لأمد طويل أو شلل لن يزول. ترتفع نسبة الخطر لدى الأشخاص الذين يعانون من مشاكل بعمودهم الفقري أو المزروع لديهم نوع معين من القسطرة فوق الجافية أو الذين خضعوا لجراحة بالعمود الفقري. يزداد الخطر كذلك لدى الأشخاص الذين يتناولون أي أدوية أخرى قد تؤثر في تجلط الدم، مثل مضادات تخثر الدم (كوارفارين) أو الأسبرين أو الأدوية المضادة للالتهاب غير الستيرويدية (NSAID) مثل إيبوبروفين أو نابروكسين.
- أخبر طبيبك بأنك تستخدم هذا العقار قبل الخضوع لجراحة في العمود الشوكي أو فوق الجافية. اتصل بطبيبك في الحال إذا ظهرت عليك أي دلائل على حدوث مشكلات عصبية مثل ألم الظهر أو التتميل أو الوخز أو ضعف العضلات أو الشلل أو فقدان التحكم في المثانة أو الأمعاء.
- أخبر جميع مقدمي الرعاية الصحية بأنك تناولت هذا العقار. وهذا يشمل الأطباء، والممرضات، والصيدلة، وأطباء الأسنان. قد يتعين وقف هذا العقار قبل إجراء أنواع معينة من الجراحة حسب تعليمات الطبيب. إذا تم وقف هذا العقار، سيخبرك الطبيب متى تبدأ في تناول هذا العقار ثانية بعد الجراحة أو الإجراء الطبي.
- قد تكون أكثر قابلية للنزيف. توخ الحذر وتجنب الإصابة. استخدم فرشاة أسنان ناعمة وماكيناة حلاقة كهربائية.
- إذا وقعت أو آذيت نفسك، أو إذا ارتطم رأسك، اتصل بطبيبك فوراً. يُرجى استشارة طبيبك حتى إذا كنت تشعر بتحسن.
- إذا كنت تبلغ من العمر 65 عاماً أو أكثر، فيرجى استعمال هذا الدواء مع توخي الحذر. فقد يؤدي ذلك إلى ظهور مزيد من الأعراض الجانبية.
- تناول ريفاروكسابان مع الطعام في نفس الوقت كل يوم.
- إذا نسيت تناول جرعة من عقار ريفاروكسابان :
- إذا كانت جرعتك مرة واحدة في اليوم: خذ ريفاروكسابان بمجرد أن تتذكر في نفس اليوم. خذ جرعتك التالية في الوقت المحدد بانتظام.
- إذا كانت جرعتك مرتين في اليوم: تناول ريفاروكسابان بمجرد أن تتذكر في نفس اليوم. يمكنك تناول جرعتين في نفس الوقت لتعويض الجرعة الفائتة. خذ جرعتك التالية في الوقت المحدد بانتظام.
- **يجب إخطار طبيبك، إذا كنت حاملاً أو تخططين للحمل، أو ترضعين رضاعة طبيعية. لا بد من التشاور بخصوص الفوائد، والمخاطر التي قد تتعرضين لها أنت والجنين.**

Pharmacy Services Department –Reference: JHAH Health Encyclopedia and Product Information

This content is for informational purposes and is not intended to be a substitute for the advice of a healthcare professional. It is important that you rely on the advice of a healthcare professional for your specific condition

هذا المحتوى هو لأغراض تيقفية وهو ليس معد كبديل للنصيحة التي يقدمها الطبيب أو مقدم الرعاية الصحية. من المهم أن تعتمد على نصيحة طبيبك ومقدم الرعاية الصحية فيما يخص حالتك.

Safe use of Rivaroxaban الإستعمال الآمن لدواء ريفاروكسابان

- Do not stop taking this drug without talking to your doctor. Stopping this drug before you are supposed to may raise the chance of blood clots. If you need to stop this drug, your doctor will tell you how.
- People who have any type of spinal or epidural procedure are more likely to have bleeding problems around the spine when already on this drug. This bleeding rarely happens, but can lead to not being able to move body (paralysis). The risk is also raised in people who take any other drugs that may affect blood clotting, like blood-thinner drugs (like warfarin), aspirin, or nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) like ibuprofen or naproxen.
- Tell your doctor you use this drug before you have a spinal or epidural procedure. Call your doctor right away if you have any signs of nerve problems like back pain, numbness or tingling, muscle weakness, paralysis, or loss of bladder or bowel control.
- *If you miss a dose of rivaroxaban:*
- If your dose is once daily: Take rivaroxaban as soon as you remember on the same day. Take your next dose at your regularly scheduled time.
- If your dose is twice a day: Take rivaroxaban as soon as you remember on the same day. You may take 2 doses at the same time to make up for the missed dose. Take your next dose at your regularly scheduled time.
- **Tell your doctor if you are pregnant, plan on getting pregnant, or are breast-feeding. You will need to talk about the benefits and risks for you and your baby**
- Tell all of your health care providers that you take this drug. This includes your doctors, nurses, pharmacists, and dentists. This drug may need to be stopped before certain types of surgery as your doctor has told you. If this drug is stopped, your doctor will tell you when to start taking this drug again after your surgery or procedure.
- You may bleed more easily. Be careful and avoid injury. Use a soft toothbrush and an electric razor
- If you fall or hurt yourself, or if you hit your head, call your doctor right away. Talk with your doctor even if you feel fine.
- If you are 65 or older, use this drug with care. You could have more side effects.
- Take rivaroxaban with food at the same time each day.

Pharmacy Services Department –Reference: JHAH Health Encyclopedia and Product Information

This content is for informational purposes and is not intended to be a substitute for the advice of a healthcare professional. It is important that you rely on the advice of a healthcare professional for your specific condition

هذا المحتوى هو لأغراض تثقيفية وهو ليس معد كبديل للنصيحة التي يقدمها الطبيب أو مقدم الرعاية الصحية. من المهم أن تعتمد على نصيحة طبيبك ومقدم الرعاية الصحية فيما يخص حالتك.