

Safe use of Valproic / Valproate (Depakine) الإستخدام الآمن لدواء فالبرويك / فالبروايت (ديباكين)

يُحظر تناول هذا العقار إذا كنت حاملاً. يجب إجراء حمل اختباري للتأكد من أنك لست حاملاً قبل بدء تناول هذا العقار. تحدثي إلى طبيبك في هذا الأمر قبل بدء تناول هذا العقار.

تجنبي استخدام هذا العقار إذا كنتِ قادرة على الحمل، وإذا كنتِ لا تستخدمين وسيلة منع حمل فعالة لتجنب حدوث حمل. يجب عليكِ استخدام وسيلة لمنع الحمل خلال فترة تناول هذا العقار.

ما هي بعض الأشياء التي يلزمني معرفتها أو فعلها أثناء تناولي لهذا العقار؟

- تجنب قيادة السيارة أو القيام بمهام أو أنشطة أخرى تتطلب منك اليقظة أو وضوح الإبصار حتى ترى تأثير هذا العقار عليك.
- عليكِ إجراء فحوصات دم حسب تعليمات الطبيب. يرجى استشارة الطبيب.
- قد يؤثر هذا العقار على بعض التحاليل المخبرية. أخبر جميع مقدمي الرعاية الصحية لك والعاملين في المختبر بأنك تتناول هذا العقار.
- قد تحتوي بعض العلامات التجارية لهذا العقار على زيت الفول السوداني. إذا كنت تعاني من الحساسية تجاه الفول السوداني، فاستشر الصيدلي عما إذا كانت العلامة التجارية التي تستخدمها من هذا العقار تحتوي على زيت الفول السوداني.
- قد تصاب بنزيف بسهولة أكثر. كن حريصاً، وتجنب الإصابة. ينبغي استعمال فرشاة أسنان ناعمة وماكينة حلاقة كهربائية.

اخبر طبيبك أو احصل على المساعدة الطبية على الفور إذا ظهرت لديك أي من العلامات أو الأعراض التالية والتي قد تكون مرتبطة بآثار جانبية عالية الخطورة:

- أعراض لرد فعل تحسسي، مثل الطفح الجلدي، أو احمرار البشرة أو تورمها أو انتشار البثور عليها أو تقشرها، ويصاحب ذلك حمى أو بدون حمى، أو صفير عند التنفس، أو ضيق في الصدر أو الحلق، أو صعوبة في التنفس أو البلع أو الكلام، أو حدوث بحّة غير عادية، أو تورم في الفم أو الوجه أو الشفتين أو اللسان أو الحلق.
- أعراض العدوى كالحمى، أو القشعريرة، أو التهاب شديد في الحلق، أو وجود ألم بالأذن أو الجيوب الأنفية، أو السعال، أو زيادة في البلغم أو تغير لونه، أو ألم عند التبول، أو وجود قروح بالفم، أو الإصابة بجرح لا يندمل.
- أعراض ارتفاع مستويات الأمونيا مثل عدم انتظام ضربات القلب أو التنفس غير الطبيعي أو الشعور بالارتباك أو شحوب الجلد أو بطء في سرعة ضربات القلب أو نوبات صرع أو تعرق أو قيء أو رعشة.
- ألم في الصدر أو تورم بالأذرع أو الأرجل.

Pharmacy Services Department –Reference: JHAH Health Encyclopedia and Product Information

This content is for informational purposes and is not intended to be a substitute for the advice of a healthcare professional. It is important that you rely on the advice of a healthcare professional for your specific condition

هذا المحتوى هو لأغراض تثقيفية وهو ليس معد كبديل للنصيحة التي يقدمها الطبيب أو مقدم الرعاية الصحية. من المهم أن تعتمد على نصيحة طبيبك ومقدم الرعاية الصحية فيما يخص حالتك.

Safe use of Valproic / Valproate (Depakine) الإستخدام الآمن لدواء فالبرويك / فالبروايت (ديباكين)

Do NOT take this medication if you are pregnant.

You must have pregnancy tests that show you are **NOT pregnant before starting this medication.**
 Discuss with your doctor before starting this medication.

Do not take this drug if you are able to get pregnant and are not using effective birth control to prevent pregnancy. You must use birth control while taking this drug.

What are some things I need to know or do while I take this medication?

- Avoid driving and doing other tasks or actions that call for you to be alert or have clear eyesight until you see how this drug affects you.
- Have blood test checked as you have been told by the doctor.
- This drug may affect certain lab tests. Tell all of your health care providers and lab workers that you take this drug.
- Some brands of this drug have peanut oil in them. If you are allergic to peanuts, check with your pharmacist to see if your brand has peanut oil in it.
- You may bleed more easily. Be careful and avoid injury. Use a soft toothbrush and an electric razor.

Tell your doctor or get medical help right away if you have any of the following signs or symptoms that may be related very serious effects:

- Signs of an allergic reaction, like rash; hives; itching; red, swollen, blistered, or peeling skin; wheezing; tightness in the chest or throat; trouble breathing, swallowing, or talking; unusual hoarseness; or swelling of the mouth, face, lips, tongue, or throat.
- Signs of infection like fever, chills, very bad sore throat, ear or sinus pain, cough, more sputum or change in color of sputum, pain with passing urine, mouth sores, or wound that will not heal.
- Signs of high ammonia levels like a heartbeat that does not feel normal, breathing that is not normal, feeling confused, pale skin, slow heartbeat, seizures, sweating, throwing up, or twitching.
- Swelling in the arms or legs.

Pharmacy Services Department –Reference: JHAH Health Encyclopedia and Product Information

This content is for informational purposes and is not intended to be a substitute for the advice of a healthcare professional. It is important that you rely on the advice of a healthcare professional for your specific condition

هذا المحتوى هو لأغراض تثقيفية وهو ليس معد كبديل للنصيحة التي يقدمها الطبيب أو مقدم الرعاية الصحية. من المهم أن تعتمد على نصيحة طبيبك ومقدم الرعاية الصحية فيما يخص حالتك.